



Association suisse
pour la protection des
Oiseaux (ASPO)
BIRDLIFE SUISSE
Case postale
8036 Zurich
TEL 01 463 72 71
FAX 01 461 47 78




Station ornithologique
suisse
6204 Sempach
TEL 041 462 97 00
FAX 041 462 97 10



Nos oiseaux
Société romande pour
l'étude et la protection
des oiseaux
c/o Musée d'histoire
naturelle
2300 La Chaux-de-
Fonds
TEL 032 913 39 76
FAX 032 913 39 76

Auteur: Kurt Bollmann
1998
© ASPO, Nos
Oiseaux & Station
ornithologique suisse.
La reproduction
avec références
est souhaitée.

NOURRISSAGE HIVERNAL DES OISEAUX



Est-il judicieux de nourrir les oiseaux en hiver ?

Seuls les oiseaux nicheurs et hivernants les plus fréquents de notre pays bénéficient du nourrissage hivernal; leurs populations ne sont presque pas mises en danger par les conditions de vie de la saison froide auxquelles elles sont habituées. D'ailleurs, elles sont aussi nombreuses dans les régions où elles ne reçoivent pas de nourriture. Les espèces rares et menacées figurant sur la liste rouge, ne viennent pas aux mangeoires. En fait, le maintien d'un environnement riche et sain constitue l'objectif central de la sauvegarde de la diversité des oiseaux. Du point de vue d'une protection appropriée de la nature et des oiseaux, le nourrissage des oiseaux en liberté n'est fondamentalement pas nécessaire et ne présente pas une aide significative pour résoudre les problèmes de protection des oiseaux. Un nourrissage hivernal modéré n'est cependant pas nuisible. Donner des graines offre une bonne occasion d'observer les oiseaux de près et un contact enrichissant avec la nature. C'est pourquoi, il n'y a aucune objection à un approvisionnement minime et c'est d'ailleurs souvent le premier pas vers une activité plus large de protecteur de la nature et des oiseaux.

Règle générale pour le nourrissage hivernal:

1. Quand doit-on nourrir les oiseaux?

- en principe, seulement pendant les mois d'hiver,
- dans tous les cas, seulement quand une couche de neige recouvre le sol, quand le sol est profondément et durablement gelé ou lors de pluies givrantes; il n'est pas nécessaire d'habituer les oiseaux en leur donnant à manger plus tôt,
- moments de la journée: matin et soir. Le matin, les oiseaux ont faim et le soir, ils doivent se préparer pour une longue nuit. Le matin avant qu'il ne fasse vraiment jour et le soir environ deux heures avant le crépuscule.

2. Que doit-on leur donner ?

- **les granivores** (oiseaux à bec corne et fort : fringillidés, moineaux, bruants) préfèrent les graines de tournesol et de chanvre, ainsi que les mélanges de graines habituels que l'on trouve dans le commerce. Ils prennent aussi la nourriture destinée aux insectivores,
- **les insectivores** (oiseaux à bec fin et pointu) consomment avant tout une nourriture animale et des petites graines. Peu d'espèces, tels le merle noir, le rougegorge et l'étour-


neau fréquentent régulièrement les mangeoires. On peut leur offrir des flocons d'avoine, des raisins secs, des fruits, même un peu pourris, des noix et des noisettes, de la graisse ou du séré. Pour des raisons écologiques, on évitera d'offrir des noix exotiques (par exemple cacahuètes),

- **les migrateurs** : en automne (rarement) et surtout au printemps, des chutes de neige peuvent empêcher les migrateurs de trouver leur nourriture. Ces espèces ne s'approchent guère des mangeoires. On peut les aider en découvrant les tas de fumiers et en enlevant la neige sous les arbres et les buissons,
- il ne faut pas donner de nourriture salée telle que lard et pommes de terre assaisonnées. Le pain n'est pas recommandé, à part pour les oiseaux d'eau, car il gonfle dans l'estomac. Il ne faut pas non plus offrir de l'eau.

3. Comment doit-on les nourrir?

- la nourriture devrait être à l'abri de l'humidité et du gel (mangeoires dont les réserves de graines sont protégées, filets ou anneaux à graines),
- à proximité de la mangeoire, il devrait y avoir des arbres et des buissons qui puissent servir d'abri en cas de danger,
- les abords immédiats de la mangeoire devraient être à découvert, dans un rayon de deux mètres au minimum, afin que les prédateurs tels que les chats ne puissent guetter les oiseaux,
- la transmission de maladies contagieuses est de loin le plus grand danger sur les lieux de nourrissage hivernaux. Les oiseaux ne devraient pas pouvoir se poser sur les graines afin de ne pas souiller la nourriture par leurs fientes. Si c'est le cas, il faut nettoyer la mangeoire avec de l'eau chaude. Ainsi, le danger d'une épidémie de sal-

monellose est diminué. Il s'agit d'une infection mortelle des intestins due à des bactéries. Si vous trouvez des oiseaux morts autour de la mangeoire, il faut tout de suite les enlever et nettoyer la mangeoire avec de l'eau bouillante et un désinfectant (y ajouter par exemple 1 % d'incidine). Il faut attendre 2 ou 3 jours avant de recommencer à alimenter les oiseaux.



4. Combien de temps doit-on nourrir les oiseaux?

- vers la fin de l'hiver, il faut arrêter progressivement et surtout pas du jour au lendemain. Si vous réduisez la quantité et la fréquence peu à peu, vous permettez aux oiseaux de se réhabituer à leur quête normale de nourriture,
- en aucun cas, ils ne peuvent être nourris pendant la période de nidification! Même les jeunes granivores sont nourris avec des insectes à ce moment-là. La plupart des oiseaux ne supportent pas encore la nourriture végétale difficile à digérer et pourraient succomber aux mélanges hivernaux que leurs parents leur apporteraient.